



2º Simpósio Sobre Infecção por Micobactérias

Valeria Azevedo
Unimed Rio

Casos Confirmados de Micobacteriose

- 37 casos confirmados

- Distribuição dos casos:

32 sexo feminino

05 sexo masculino

Faixa Etária: 23 a 77 anos

Média: 45 anos

Casos Confirmados de Micobacteriose

- Procedimento Cirúrgico Inicial:
 - Colecistectomia – 26 (70%)
 - Cirurgia Bariátrica – 04 (11%)
 - Ooforectomia - 02
 - Colectomia Direita – 01
 - Herniorrafia Inguinal – 01
 - Apendicectomia - 01
 - Laparoscopia para Lise de Aderência – 01
 - Miomectomia – 01

Casos Confirmados de Micobacteriose

- Intervalo de tempo entre a cirurgia inicial e o diagnóstico:
Média de 4 meses
- Principais Procedimentos Realizados:
 - Laparotomia para Drenagem de Abscessos
 - Extensos Ferimentos, Cicatrizes ou Tumores –
Excisão com Retalhos Cutâneos

Custo Anual com Descartáveis Colecistectomia

- Colecistectomia:

04 Trocarteres

01 Agulha de Veress

01 Pinça de Apreensão

01 Pinça de Dissecção

01 Tesoura

01 Endoclipador

Valor Total: R\$ 5.225,74

Nº de cirurgias/ano : 2388 (média de 19 cirurgias/mês)

Custo anual com descartáveis: **R\$ 12.479.067,12**